

## **Priprema za cirkumziciju:**

Dva sata prije intervencije dijete ne smije nista da jede (to uključuje dojenje, adaptirano mlijeko, kašice, čvrstu hranu, guste sokove). Djetetu po potrebi, u malim količinama, smijete dati vodu, čaj ili bistri sok od jabuke.

Potrebno je ponijeti čistu pelenu, vlažne maramice i dekiću.

Po završetku intervencije na ranu se stavlja Gentamicin mast preko koje se stavlja vazelinska gaza i suha sterilna gaza 5x5 cm. Djetetu se aplicira Paracetamol supozitorij preventivno, protiv bolova.

Kontrolni pregled nakon cirkumzicije se obavlja kroz 3 dana, a po potrebi i ranije.

## **Postoperativna njega (uputstvo za roditelje):**

Tri puta dnevno na ranu stavljati Gentamicin mast (ili neku drugu mast koju ljekar propiše), prekriti vazelinskom, zatim suhom sterilnom gazom.

U 20:00h uvečer djetetu je potrebno dati analgetik, naziv lijeka, oblik i dozu određuje ljekar nakon intervencije, a za isti ćete dobiti propisan recept.

Izbjegavati kupanje i tuširanje djeteta, kvašenje rane, do kontrole.

Na dan kontrole dijete se previja i roditeljima se daju upute kako da održavaju higijenu dok rana ne zaraste i konci ne ispadnu.